

'NOTULES SUR QUELQUES ORCHIDÉES D'INDOCHINE. III¹

Par A. GUILLAUMIN.

PROFESSEUR AU MUSÉUM.

Cleisostoma Vacherotiana Guillaum. in *Bull. Soc. nat. Hort. France*, 6^e série, I, p. 178 (nomen), sp. nov.

Caulis brevis, crassa. Folia disticha, linearia, usque ad 22 cm. longa, 1,5 cm. profunde carinata, coriacissima, apice valde inaequaliter 2-lobata primumque mucronata, laevia, palliae, viridia vaginis apertis. Inflorescentia circa 10 cm. longa, dimidio superiore dense florigera, scapo robusto, vaginis 5, bracteiformibus, valde obtusis, brunneis, bracteis ovatis, 3 mm. longis, obtusissimis, floribus circa 20, fere 2,5 cm. latis, suaveolentibus, sepalis petalique apice violaceis, medio violaceo marmoratis, basi albis, sepalis lateralibus pallidioribus; labelli lobo medio intensius violaceo, marginibus pallidiore venoso, lobis lateralibus albis, columna prater in utroque latere linea violacea alba; sepalis ovatis, obtusis, superiore 14 mm. × 5 mm., labelli lobo marginibus undulato, apice leviter emarginato, basin versus gibboso et breviter coniceque calcarato, calcaris ore lamina minute papillosa, retrorsum occludente, lobis lateralibus parum distinctis; columna brevi (5 mm.); anthera acute rostrata, operculo valde convexo, intus marginibus laminibus 2, erosis, munito, pollinibus globosis, profunde sulcatis, fasciula fere filiformi, pollinibus 2-plō longiore, sessilibus, glandula parva; ovario a pedicello indistincto, albo.

Annam : Darlac (*Petit*) donné par M. Vacherot (f. 1407-1947).

Appartient évidemment au même groupe que le *C. Poilanei* Gagnep. et *C. pilosulum* Gagnep. cités dans la *Flore d'Indo-Chine*, VI, p. 487 (1933) et que le *C. ? Petitiana* Guillaum. décrit depuis (*Bull. Mus.*, 2^e sér., XVII, p. 434, 1945).

1. Cfr. *Bull. Mus.* 2^e sér., XII, p. 351, 1940 et XVII, p. 434, 1945.